

EN-REP: DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG, Grabenackerstraße 77, 8156 Obernai, Switzerland ☎ +41 448850634

EN Operating Instructions
Lunos® Prophy Powder Perio Comb
Prophy Powder Perio Comb (REF: CPZ640A1950)

Product description
“Prophysis Powder Perio Comb” is a medical device. This product is only intended for professional dental application, must be used exclusively by qualified personnel. Prophysis Powder Perio Comb is designed for sub- and supragingival application in commercial powder jet devices. Please note the operating instructions of the powder jet device before use of the prophysis powder. The formulation is free of animal ingredients, gluten, lactose, fructose and microplastics.

Indication
This product is recommended for:
• Removal of periodontal biofilm in the scope of periodontal maintenance therapy (recall therapy), with a suitable subgingival nozzle, e.g. Perio Tip or Dürr Dental
• Cleaning implant surfaces to support treatment of mucositis or peri-implantitis after completed initial therapy
• Gentle removal of plaque at the sulcus and particularly sensitive dental surfaces
• Removal of slight discolorations in supragingival regions
• Removal of plaque on orthodontic appliances (brackets)
Prophysis Powder Perio Comb is suitable for children and adults. This product does not have a cariogenic effect. Do not swallow.

Contraindication
Patients suffering from chronic airway diseases (e.g. bronchitis or asthma) must not be treated with a powder-water jet device since the powder present in the aerosol can lead to difficult breathing (choking) and asthma. During the application, the patient may experience hypersensitized enamel and white spots. The treatment of deep periodontal pockets can lead to bacteraemia. Therefore, suitable measures and restrictions must be undertaken for the treatment of risk patients (endocarditis, pregnant and lactating women, infectious diseases, immunodeficiencies (neuropathy, agranulocytosis, diabetes, haemophilia), patients on treatment (radiation therapy, chemotherapy, antibiotic therapy).

Warning
Do not swallow. Avoid contact with the eyes. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water. All serious events that are associated with the product must be immediately reported to the manufacturer and the competent authority of your member state. The product is intended for use on human subjects.
Precautions
Use appropriate protective equipment when working with “Prophysis Powder Perio Comb”. The patient and operator need to wear suitable eye protection, e.g. protective goggles. The operator needs to wear suitable protective equipment in the form of mouth nose protection and suitable protective gloves. Use a suitable spray mist aspiration (manual) or the Dürr Dental Prophysis Canula “Prophysis Canula”. Prophysis Powder Perio Comb may only be used by appropriately trained dental specialists. Please make sure not to direct the jet of the powder jet device directly at fixed dental restorations and fillings as this may damage the restorations. Do not direct the spray nozzle directly at the gingiva during the treatment. Direct exposure of the soft tissue may damage the gingiva. Also there is a risk of emphysema arising in the tissue and/or of embolism from air being introduced into blood circulation. To protect sensitive skin, please apply vaseline to the treatment area before the application of the powder and use appropriate protective clothing (utilizzo di sbiancatori a getto di polvere in commercio. Prima di utilizzare la polvere per proflassi, leggere le istruzioni per l'uso dello sbiancatore a getto di polvere. La formulazione è priva di ingredienti di origine animale, glutine, lattosio e microplastiche.

Elimination
Elimination conformément aux prescriptions locales réglementaires.

Composition
DüRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidestraat 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT Istruzioni d'uso
Lunos® Polvere per i proflassi Perio Comb
Polvere per proflassi Perio Comb (REF: CPZ640A1950)

Descrizione del prodotto
La “Polvere per proflassi Perio Comb” è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’applicazione odontoiatrica professionale e può essere utilizzato solo da personale tecnico specializzato. La “Polvere per proflassi Perio Comb” è prevalentemente destinata all’applicazione sottogingivale e supragingivale tramite l'utilizzo di sbiancatori a getto di polvere in commercio. Prima di utilizzare la polvere per proflassi, leggere le istruzioni per l'uso dello sbiancatore a getto di polvere. La formulazione è priva di ingredienti di origine animale, glutine, lattosio e microplastiche.

Indicazioni
Questo prodotto viene empfohlen zur:
• Entfernung von parodontalen Biofilmen im Rahmen der parodontalen Erhaltungstherapie (Recall-Therapie), mit einem geeigneten Subgingivalen Nozzle, z.B. dem Perio Tip von Dürr Dental
• Reinigung von Implantatoberflächen zur Unterstützung der Mucositisstherapie oder Periimplantitisstherapie nach erfolgter Initialtherapie
• Entfernen von leichtem Zahnschmelz und Zahnaufhellung
• Entfernen von Plaque auf kieferorthodontischen Apparaturen (Klackets)
Das Prophysispulver Perio Comb ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Das Produkt ist nicht kariogen. Nicht verschlucken.

Contraindikation
Patienten, die an chronischen Atemwegserkrankungen (z.B. Bronchitis oder Asthma) leiden, dürfen nicht mit einem Pulver-Wasserstrahlgerät behandelt werden, da das Aerosol auf nicht-pulverisierte Zahnfüllungen und Füllungen auswirken kann. Ebenso sollte die Anwendung auf nicht-pulverisierte Zahnoberflächen und Zahnoberflächen mit „White Spots“ unterbunden werden. Bei der Anwendung des Pulverstrahlgerätes ist das Bakterienrisiko zu beachten. Daher sind für Risikopatienten (Endokarditis, Schwangere, stillende Mütter, Infektionserkrankung, Immunschwäche (Neuropathie, Agranulozytose, Diabetes, hämophil), Patienten unter Behandlung (Strahlentherapie, Chemotherapie, Antibiotikatherapie)) geeignete Maßnahmen und Einschränkungen zu treffen.

Warnhinweis
Nicht verschlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Alle im Serious events that are associated with the product, must be immediately reported to the manufacturer and the zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates zu melden. Das Präparat ist zur Anwendung am Menschen bestimmt.

Verpackungsanahmen
Bei der Arbeit mit dem „Prophysis Powder Perio Comb“ auf geeignete Schutzmaßnahmen achten. Patient und Behälter müssen einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille tragen. Der Behandler muss geeignete Schutzausrüstung, in Form von Mund-Nasen-Schutz und geeigneten Schutzhandschuhen tragen. Verwenden Sie eine geeignete Spraynebelabsaugung z.B. die Dürr Dental Prophysis Canüle. Das „Prophysis Powder Perio Comb“ darf nur von entsprechend geschultem/zem medizinischem Fachpersonal eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Strahl des Pulverstrahlgeräts nicht direkt auf nicht-pulverisierte Zahnoberflächen und Zahnoberflächen mit „White Spots“ trifft. Bei der Anwendung des Pulverstrahlgerätes ist das Bakterienrisiko zu beachten. Richten Sie die Strahlhöhe während der Behandlung nicht direkt auf das Zahnlächel. Die direkte Bestrahlung des Weichgewebes kann zu einer Schädigung des Zahnlächels führen. Außerdem besteht die Gefahr einer Emphysem-Bildung im Gewebe und/oder einer Embolie durch in den Blutkreislauf eingebrachte Luft. Zum Schutz empfindlicher Hautpartien tragen Sie bitte vor Behandlungsbeginn eine Kleidung auf, die Lappen des Patienten auf. Reinigen Sie nach Abschluss der Behandlung das Gesicht des Patienten mit einem feuchten Antiseptikum. Bitte machen Sie sich an die Verpackung des Produktes. Sehen Sie Ihren Patienten bitte darauf hin, dass Essen oder Trinken (Te, Kaffee und andere Lebensmittel) innerhalb der ersten zwei bis drei Stunden nach der Behandlung nicht erlaubt ist. Bitte vermeiden Sie auch das Rauchen und die Einnahme einer Einheitsnahrung für Patienten mit einem feuchten Tuch reinigen.

Arbeitsvorbereitung
Bitte entfernen Sie Pulverreste aus der Pulverkammer für Pulverstrahlgeräts vor der Anwendung mit Wasser. Entfernen Sie das Pulver aus der Pulverkammer der Flasche, bevor Sie das „Prophysis Powder Perio Comb“ entnehmen. Bitte entfernen Sie die Extrakte des Pulvers das Originalitätsstempel. Entfernen Sie zu diesem Zweck den Deckel der Flasche vollständig, ziehen Sie das Siegel ab und schrauben Sie anschließend mit Wasser reinigen. Bitte achten Sie vor Befüllen der Pulverkammer gründig darauf, dass diese vollständig trocken ist. Es darf keine Restfeuchtigkeit, z.B. von Aufbereitungsmitteln, in der Kammer vorhanden sein. Bitte vermeiden Sie auch das Rauchen und die Einnahme einer Einheitnahrung für Patienten mit einem feuchten Tuch reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit
Bitte achten Sie darauf, die Flaschen sorgfältig nach Entnahme des Pulvers wieder sorgfältig zu verschließen, damit das Prophysispulver keine Feuchtigkeit aufnimmt. In geschlossenen, luftdichten Räumen, unter Vermeidung von Feuchtigkeit und intensiver Lichtbestrahlung (0°C und 25°C mit 10% bis 75% relativer Feuchtigkeit) für die Dauer der Verfallsfrist einreinstrahlschutz. Bei Einhaltung der Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde 36 Monate, nach Anbruch 12 Monate.

Emborsung
Bitte wenden Sie sich an den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Zusammenhang
Prophysispulver Perio Comb: Trehalose, Hilfsstoffe
Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 74, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

la canule de prophylaxie Dürr Dental. La « poudre prophylactique Perio Comb » doit être appliquée exclusivement par un personnel qualifié en médecine dentaire. Veuillez toujours lire le jet de l'appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas la buse de projection directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Préparation du travail
Veuillez débarrasser le compartiment à poudre de l'appareil à jet de poudre des résidus de poudre et nettoyez-le avec une buse sous-gingivale appropriée, par ex., le Perio Tip de Dürr Dental. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le compartiment à poudre est complètement vide ou de l'eau, car la poudre se trouvant dans le compartiment à poudre peut endommager le manchon du fluxon, etc./opercule et risquer complètement le bouchon du fluxon. Certifiez-vous que le compartiment à poudre est parfaitement sec avant de le remplir. Il ne doit rester dans le compartiment aucune humidité résiduelle, par ex., restant d'une précédente préparation de traitement. Veillez impérativement à ne pas dépasser la hauteur maximale de remplissage du compartiment à poudre lorsque vous y mettez la poudre. Pour limiter la formation de poussière en remplissant le compartiment, il est recommandé d'utiliser le « cultuteur » et de ne serrer que légèrement le flacon.

Stockage et durée de conservation
Veuillez assurer d'avoir soigneusement fermé le flacon directement après avoir prélevé la poudre dans le flacon. Veuillez utiliser le produit dans les 36 mois à compter des dates des endroits fermés et bien ventilés, en évitant l'humidité et la lumière intense, entre 0 °C et 25 °C, à 10 à 75 % d'humidité relative. Protéger des rayons directs et des équipements sensibles.
Avvertenze
Assicurarsi che il contenitore di conservazione sia ben chiuso e conservato in un ambiente ventilato e protetto dalla luce e dall'umidità. Evitare di utilizzare la polvere per proflassi in ambienti umidi e ben ventilati.
Elimination
Elimination conformément aux prescriptions locales réglementaires.

Composizione
DüRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidestraat 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil de projection de poudre, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe du canon de pulvérisation peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant de commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex. Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après utilisation de la poudre prophylactique.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Preparación del trabajo
Después de eliminar los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo Perio Comb, limpie y seque completamente la cámara de polvo antes de tomar el "Polvo profláctico Perio Comb". Agite la botella cerrada antes de volver a utilizar la "Polvere per proflassi Perio Comb". Retire el precinto antes de tomar el polvo. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Eliminación
Eliminazione conformemente alle prescrizioni locali regolamentari.
Composizione
DÜRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidestraat 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil de projection de poudre, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe du canon de pulvérisation peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant de commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex. Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après utilisation de la poudre prophylactique.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Preparación del trabajo
Después de eliminar los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo Perio Comb, limpie y seque completamente la cámara de polvo antes de tomar el "Polvo profláctico Perio Comb". Agite la botella cerrada antes de volver a utilizar la "Polvere per proflassi Perio Comb". Retire el precinto antes de tomar el polvo. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Eliminación
Eliminazione conformemente alle prescrizioni locali regolamentari.
Composizione
DÜRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidestraat 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Preparación del trabajo
Después de eliminar los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo Perio Comb, limpie y seque completamente la cámara de polvo antes de tomar el "Polvo profláctico Perio Comb". Agite la botella cerrada antes de volver a utilizar la "Polvere per proflassi Perio Comb". Retire el precinto antes de tomar el polvo. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par ex. bronchite ou asma) ne deben ser tratados con un aparato de chorro de agua y polvo, ya que esto puede provocar dificultades en la vías respiratorias, especialmente en los pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias. Durante el tratamiento, no dirija el chorro de agua y polvo directamente a la lengua ni a la boca. No dirija el chorro de agua y polvo directamente a la encía durante el tratamiento. La aplicación del chorro directo en tejidos blandos puede causar daños en la encía. Además, se corre el riesgo de que se forme un enfisema en el tejido y/o una embolia por la entrada de aire en el torrente sanguíneo. Para proteger las superficies dentales sensibles, aplique vaselina en los labios del paciente antes de iniciar el tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil de projection de poudre, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe du canon de pulvérisation peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant de commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après utilisation de la poudre prophylactique.

Preparación del trabajo
Después de eliminar los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo Perio Comb, limpie y seque completamente la cámara de polvo antes de tomar el "Polvo profláctico Perio Comb". Agite la botella cerrada antes de volver a utilizar la "Polvere per proflassi Perio Comb". Retire el precinto antes de tomar el polvo. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil de projection de poudre, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe du canon de pulvérisation peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant de commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après utilisation de la poudre prophylactique.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Preparación del trabajo
Después de eliminar los restos de polvo de la cámara de polvo del pulverizador de chorro de polvo Perio Comb, limpie y seque completamente la cámara de polvo antes de tomar el "Polvo profláctico Perio Comb". Agite la botella cerrada antes de volver a utilizar la "Polvere per proflassi Perio Comb". Retire el precinto antes de tomar el polvo. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par ex. bronchite ou asma) ne devem ser submetidos a tratamento com um dispositivo de polimento a ar e água, uma vez que o aerosol que se encontra no pó pode causar dificuldades respiratórias, especialmente em doentes com antecedentes de doenças respiratórias. Durante o tratamento, não dirija o jato de água e pó diretamente para a língua nem para a boca. Não dirija o jato de água e pó diretamente para a gengiva durante o tratamento. A aplicação do jato direto em tecidos moles pode causar danos na gengiva. Além disso, há o risco de formação de um enfisema no tecido e/ou de uma embolia em caso de injeção de ar na corrente sanguínea. Para proteger as superfícies dentares sensíveis, aplique vaselina nos lábios do paciente antes de iniciar o tratamento. Após o término do trabalho de limpeza, limpe o rosto do paciente com um lenço úmido descartável, por exemplo, com Lunos®. Avise aos seus pacientes que o fato de beber ou comer (chá ou café) dentro de três horas após o tratamento pode causar descolorações nos dentes. Limpe as superfícies da unidade dental após a aplicação do pó profíctico com um pano úmido.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par exemple bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages, car cela pourrait endommager les restaurations. N'orientez pas le canon de pulvérisation directement sur la gencive au cours du traitement. L'exposition directe de la buse de projection peut endommager la gencive. Il existe également un risque d'apparition d'un emphyème sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine. Pour protéger les surfaces dentaires sensibles, appliquez de la vaseline sur les dents du patient avant le début du traitement. Une fois le traitement terminé, nettoyez le patient avec une lingette jetable, p. ex., lingette Lunos®. Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut entraîner la coloration des dents. Nettoyez la surface dentaire avec une lingette après l'application de la poudre prophylactique.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

utilizado por personal dentario devidamente formado. Certifique-se de que o jato do dispositivo de polimento a ar não é apontado diretamente na gengiva antes e aos dentes, pois isso pode causar dificuldades respiratórias, especialmente em doentes com antecedentes de doenças respiratórias. Durante o tratamento, não dirija o jato de água e pó diretamente para a língua nem para a boca. Não dirija o jato de água e pó diretamente para a gengiva durante o tratamento. A aplicação do jato direto em tecidos moles pode causar danos na gengiva. Além disso, há o risco de formação de um enfisema no tecido e/ou de uma embolia em caso de injeção de ar no torrente sanguíneo. Para proteger as superfícies dentares sensíveis, aplique vaselina nos lábios do paciente antes do início do tratamento. Após a conclusão do tratamento, limpe o rosto do paciente com um lenço úmido descartável, p. ex., o lenço Lunos®. Avise aos seus pacientes que o fato de beber ou comer (chá ou café) dentro de três horas após o tratamento pode causar descolorações nos dentes. Limpe as superfícies da unidade dentária com um pano húmido após a aplicação do "pó profíctico".

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta
• Rimozione delicata della placca nella zona del solco e dalle superfici dentali particolarmente sensibili
• Rimozione di discolorie lievi nella zona sopra-gingivale
Questo prodotto non deve essere ingerito e non deve essere aspirato. Se si ha contatto con gli occhi, risciacquare con acqua. Tutti gli eventi gravi che sono associati al prodotto devono essere immediatamente segnalati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro. Il preparato è destinato all'uso nell'uomo.

Contraindication
Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par ex. bronchite ou asma) no deben ser sometidos a tratamiento con un dispositivo de polimento a ar y agua, una vez que el aerosol que se encuentra en el polvo puede provocar dificultades en las vías respiratorias, especialmente en los pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias. Durante el tratamiento, no dirija el chorro de agua y polvo directamente a la lengua ni a la boca. No dirija el chorro de agua y polvo directamente a la encía durante el tratamiento. La aplicación del chorro directo en tejidos blandos puede causar daños en la encía. Además, se corre el riesgo de que se forme un enfisema en el tejido y/o una embolia por la entrada de aire en el torrente sanguíneo. Para proteger las superficies dentales sensibles, aplique vaselina en los labios del paciente antes de iniciar el tratamiento. Una vez finalizado el trabajo de limpieza, limpie la cara del paciente con una toallita húmeda desechable, p. ej., con Lunos®. Avisa a tus pacientes que el hecho de beber o comer (té o café) dentro de las tres horas posteriores al tratamiento puede causar decoloraciones de los dientes. Limpia las superficies de la unidad dental tras la aplicación del polvo profláctico con un paño húmedo.

Indicazioni
Questo prodotto è raccomandato per:
• Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), tramite il "Prophy Powder Perio Comb", con un idoneo nozzle subgingivale, ad es. il puntato Perio Tip di Dürr Dental
• Pulizia delle superfici di impianti e supporto alla salute della mucosita e della perimplantite a terapia iniziale avvenuta

„Proszek do profilaksji Perio Combi” jest wyrobem medycznym. Produkt ten jest przeznaczony do wykonywania czynności profilaktycznych, higienicznych i innych według użytych przez zaleceń personelu. Proszek do profilaksji Perio Combi” jest przeznaczony do zastosowań pod- i nadśluzówką w ogólnie dostępnych piaskarkach. Przed użyciem proszku do profilaksji należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanej piaskarki. Receptura nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, glutenu, laktozy, fruktozy ani mikropłaski.

Wskazanie do stosowania

Produkt ten jest polecany do:
* stosowania profilaktycznego w ramach perodontologicznego leczenia zachowawczego (terapia recali), przy użyciu odpowiednio końcówki podciągłowej, np. Perio Tip firmy Dürr Dental

- czyszczenia powierzchni implantów w celu wspomagania leczenia zapalenia słuzówki i lub leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
- delikatnego usunięcia płytki nazębnej w obszarze brzoń oraz w szczególnie wrażliwych powierzchniach zębnych
- usunięcia delikatnych zbrozdań w obszarze nadśluzówką
- usunięcia płytki nazębnej z aparatów ortodontycznych (zrników)

Proszek do profilaksji Perio Combi nadaje się dla dzieci i dorosłych. Produkt nie jest przeciwdroźny. Nie pokrywa.

Przeciwwskazania

Pacjenci z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli lub astma) nie mogą być poddawani zabiegom z użyciem piaskarki, ponieważ proszek znajdujący się w aerolu może prowadzić do trudności w oddychaniu. Ponadto użycie powietrza oprowadzającego się do nosa może spowodować zakażenie nosowośluzówką szklawką „białych płamy”. Zabieg w głębokich kieszkach przyniósł może prowadzić do bakteriemii. Z tego powodu należy podjąć odpowiednie działania lub zastosować ograniczenia przeciwbiegające u pacjentów z grupy ryzyka (pacjenci z osłabioną odpornością, kobiety w ciąży, konstytucyjnie osłabieni, pacjenci z ciężkimi zaburzeniami, pacjenci z neuroepi, agranulocytosis, cukrzyca, hemofilia), pacjenci poddawani leczeniu radioterapią, chemioterapią, antybiotykoterapią).

Składniki

Użyte doje na pełnię usłuzówką llnhed po odebraniu piaskarki, aby se do profilaktycznej piaskarki niedostawa wzdłozku. Składuje się w używanych a dobrej wietrzalności prostokątnych chłdnikach grzech wietkości a intensywność przygotowania przy teplotce między 10°C a 25°C pri relatywnie wilgotności w rozmezni 10% do 75 %. Chłdnikę przed używaniem słuwniczki zwrócić. Pri dozorzeniu skladowych podminkw i uzavzené nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Likvidace

Likviduje podle místních úředních předpisů.

Profilaktický prášek Perio Combi: trehalosa, pomocné látky

SK Návod na použití

Lunos® Profilaktický prášek Perio Combi

Profilaktický prášek Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

Popis výrobku

„Profilaktický prášek Perio Combi” je zdravotnická pomůcka. Tento přípravek je určen především k profesionálnímu zubolékarskému použití a smie ho používať iba kvalifikovaný odborný personál. „Profilaktický prášek Perio Combi” je určený prevenciu pre súbor perodontologických problémov. Účinnými sú zložkami: trehalosa, pomocné látky. Dôležitú úlohu zohráva aj vzhľad na obsah živín (do 75 % vlhkosť, 10-25 °C pri relatívnej vlhkosť). Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Bezpečnostní opatření

Při práci s „Profilaktickým práškem Perio Combi” dbajte na primární ochranu svých očí. Pacienti a terapeuti musí být vybaveni vhodnými ochrannými zbraňmi, napr. ochrannými maskami. Terapeut musí vhodný ochranný systém vo forme chrániť nosa a či sa vhodné ochranné rukavice. Používajte vhodný kanýľ pre odsávanie rozprášaného prášku na číste hmy, napr. profilaktický kanýľ spoločnosti Dürr Dental. „Profilaktický prášek Perio Combi” smú používať len primárne zaoškoľen zubolékarskí odborní pracovníci. Dbajte na vhodné odstraňovanie zrníkov a prístrojov podľa pokynov výrobcu. Po použití proszku očistite nástroje a navlhčte ho vo vode pri teplotě 10 °C a 25 °C pri relatívnej vlhkosť. Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho biofilmu v rámci parodontálneho liečenia (recali) terapie pomocou vhodné subgingiválneho piasku, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy nebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitídy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie ľahkého zbravení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Skaldavé podmínky

Proszek do profilaksji Perio Combi trehalosa, substancje pomocnicze

CS Návod k použití

Lunos® Profilaktický prášek Perio Combi

Profilaktický prášek Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

Popis výrobku

„Profilaktický prášek Perio Combi” je zdravotnický prostředek. Tento přípravek je určen pouze k odbornému stomatologickému použití a smie ho používať pouze odborní pracovníci. „Profilaktický prášek Perio Combi” je určený prevenciu pre súbor perodontologických problémov. Účinnými sú zložkami: trehalosa, pomocné látky. Dôležitú úlohu zohráva aj vzhľad na obsah živín (do 75 % vlhkosť, 10-25 °C pri relatívnej vlhkosť). Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro následující účely:

- odstránenie parodontálneho biofilmu v rámci parodontálneho liečenia (recali) terapie pomocou vhodné subgingiválneho piasku, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy nebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie ľahkého zbravení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali) terapie pomocou vhodné subgingiválneho piasku, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých povrchů zubů
- odstránenie ľahkého zbravení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Likvidace odpadu

Likviduje podle místních úředních předpisů.

Zloženie

Profilaktický prášek Perio Combi: trehalosa, pomocné látky

SL Navodila za uporabo

Lunos® Profilaktický prášek Perio Combi

Profilaktický prášek Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

„Profilaktický prášek Perio Combi” je medičinský prípomôcka. Za prípomôcku je nariadené jej k profesionálnemu zubozobrazovnému uporabu i na seba uporabíjači individuálno úrovni používajú. „Profilaktický prášek Perio Combi” je nariadený za súb- i supragingiválneho použitie pri prevencii perodontologických problémov. Účinnými sú zložkami: trehalosa, pomocné látky. Dôležitú úlohu zohráva aj vzhľad na obsah živín (do 75 % vlhkosť, 10-25 °C pri relatívnej vlhkosť). Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácie

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho biofilmu v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali) terapie pomocou vhodné subgingiválneho piasku, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie ľahkého zbravení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Varování

Nepolykejte. Vyhýbejte se kontaktu s očima. Při kontaktu s očima vypláchněte dostatečným množstvím vody. Všechny zvláště přilnavé přístroje, které se využívají v souvislosti s tímto prostředkem odstraňte okamžitě výrobci doporučením. Údajem v bezpečnostním štítku se řiďte. Přípravek je určen k použití u lidí i u dětí.

Způsobnostní opatření

Při práci s „Profilaktickým práškem Perio Combi” používejte vhodné osobní ochranné prostředky, napr. ochrannou masku nebo ochranný systém vo forme chrániť nosa a či sa vhodné ochranné rukavice. Používajte vhodný kanýľ pre odsávanie rozprášaného prášku na číste hmy, napr. profilaktický kanýľ spoločnosti Dürr Dental. „Profilaktický prášek Perio Combi” smú používať len primárne zaoškoľen zubolékarskí odborní pracovníci. Dbajte na vhodné odstraňovanie zrníkov a prístrojov podľa pokynov výrobcu. Po použití proszku očistite nástroje a navlhčte ho vo vode pri teplotě 10 °C a 25 °C pri relatívnej vlhkosť. Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácie

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali) terapie pomocou vhodné subgingiválneho piasku, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie ľahkého zbravení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácie
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškodenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátů pre podporu liečby mukozitídy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Prívprava práce

Odstreďte zbytky prášku ze zásobníku piaskarko pečte opätívnym naplněním profilaktickým práškem Perio Combi. Před odebráním profilaktického prášku Perio Combi negativě důkladně protřepte uzavřenou lahvičku. Před odebráním prášku lahvičku nejprve odstraňte z lahvičky pečť. To provedete tak, že zcela odstraníte vnitřní víčko lahvičky, sundáte pečeť a poté znovu zcela našroubujete víčko na lahvičku. Před naplněním zásobníku profilaktického prášku zásadně dbajte na to, aby byl zcela suchý.

Po minimální směři prášku při plnění zásobníku se doporučuje k tomuž účelu použít pouze lahvičku se šroubovatelnou zátkou a těsně uzavřenou a potom ponoruji do vody a celou lahvičku opláchnout pod tekoucí vodou. Po odstranění prášku Perio Combi lahvičku opláchněte pod tekoucí vodou při teplotě mezi 10 °C a 25 °C pri relatívnej vlhkosť. Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nebyla překročena maximální výška naplnění zásobníku práškem. Po minimální směři prášku při plnění zásobníku se doporučuje k tomuž účelu použít pouze lahvičku se šroubovatelnou zátkou a těsně uzavřenou a potom ponoruji do vody a celou lahvičku opláchnout pod tekoucí vodou. Po odstranění prášku Perio Combi lahvičku opláchněte pod tekoucí vodou při teplotě mezi 10 °C a 25 °C pri relatívnej vlhkosť. Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nebyla překročena maximální výška naplnění zásobníku práškem. Po minimální směři prášku při plnění zásobníku se doporučuje k tomuž účelu použít pouze lahvičku se šroubovatelnou zátkou a těsně uzavřenou a potom ponoruji do vody a celou lahvičku opláchnout pod tekoucí vodou. Po odstranění prášku Perio Combi lahvičku opláchněte pod tekoucí vodou při teplotě mezi 10 °C a 25 °C pri relatívnej vlhkosť. Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nebyla překročena maximální výška naplnění zásobníku práškem.

Skládavými a trvanlivostí

Użyte doje na pełnię usłuzówką llnhed po odebraniu piaskarki, aby se do profilaktycznej piaskarki niedostawa wzdłozku. Składuje się w używanych a dobrej wietrzalności prostokątnych chłdnikach grzech w wietkości a intensywność przygotowania przy teplotce między 10°C a 25°C pri relatywnie wilgotności w rozmezni 10% do 75 %. Chłdnikę przed używaniem słuwniczki zwrócić. Pri dozorzeniu skladowych podminkw i uzavzené nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Likvidace

Likviduje podle místních úředních předpisů.

Profilaktický prášek Perio Combi: trehalosa, pomocné látky

SK Návod na použitie

Lunos® Profilaktický prášek Perio Combi

Profilaktický prášek Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

Popis výrobku

„Profilaktický prášek Perio Combi” je zdravotnická pomůcka. Tento přípravek je určen zejména k profesionálnímu zubolékarskému použití a smie ho používať iba kvalifikovaný odborný personál. „Profilaktický prášek Perio Combi” je určený prevenciu pre súbor perodontologických problémov. Účinnými sú zložkami: trehalosa, pomocné látky. Dôležitú úlohu zohráva aj vzhľad na obsah živín (do 75 % vlhkosť, 10-25 °C pri relatívnej vlhkosť). Zásadne dbajte na to, aby pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia

Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne sedíca, takže proszek možie vyvolať znečistenie žiariv. Pri plnení prášku do zbernej nádoby nie boli dohrádzané skládavých podmínok v uzavzenej nádobe čini doba použitel-ného 36 mesícov, po otvorení 12 mesícov.

Indikácia
Tento výrobek se doporučuje pro:

- odstránenie parodontálneho poškovenia v rámci parodontologickej údržbavej liečby (recali terapia)
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti zvrhu, napr. Perio Tip od spoločnosti Dürr Dental
- čistenie povrchov implantátov pre podporu liečby mukozitidy alebo perimplantitídy po úspešnej inováčnej terapii
- odstránenie jemných zbrozdín v oblasti úst a v zväčšiť citlivých plochách zubov
- odstránenie ľahkých sfarbení v supragingiválnom područí
- odstránenie povrchu vytvoreného na čulstne ortodontických aparatúrach (bracketoch)

Restaurácie. A kečné soruby nie ráňujú a održovujú práčnu komoru pevne